[PS-0878]


Anti VEGF tedavisine rağmen makroanevrizmaya bağlı düzelmeyen maküla ödeminde argon lazer fotokoagusyonun tedavi üzerine etkisi

Muhammet Kaim, Hüseyin Fındık
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Rize

Sağ gözde görme azlığı nedeniyle kliniğimize başvuran hastaya daha önce 3 kez intravitreal enjeksiyon yapıldı. Sağ gözde görme 0,05 düzeyinde idi. Biomikroskopik muayenede ön segment doğal görünümde idi. Fundus muayenesinde üst temporal arkuat hizasında, santralde anevrizmayı andıran vasküler dilatasyonla birlikte yaklaşık 3mm çapında yoğun periferik eksudasyon halkası izlenmekteydi. Yapılan FFA'da süperior temporal arkuatta makroanevrizma saptandı.Tedavide Argon lazer fotokoagülasyon yapıldı.Takipde maküla ödemi geriledi ve hastanın görmesi 0,5 seviyesine çıktı.
Hasta daha önceden beyin anevrizması nedeniyle tedavi görmüş olduğunu belirtti. Noroloji kliniği ile konsülte edilen hastaya yapılan BT-anjiografide multiple anevrizmatik dilatasyonların olduğu görüldü.
Retinal makroanevrizma tanısı konan hastalarda beyin makroanevrizması açısından nöroloji konsültasyonu istenmesinin oluşabilecek komplikasyonları önlemede önemli olduğunu düşünüyoruz.


Anahtar Kelimeler: makroanevrizma,retina,

1.Tanıdaki görüntüleme




Sağ gözdeki fundus fotoğrafı ve anjiografisi

2.Tanı Anında OCT görüntüsü




Tanı Anında sağ göz OCT görüntüsü

3.Lazer Tedavisi Sonrası İlk Görüntüleme




Tedavi sonrası 4.aydaki fundus fotoğrafı ve anjiografisi

4.Diğer OCT görüntüleri



Lazer Tedavisi Sonrası 2.ay ve 20.aydaki OCT görüntüleri

5.Son Görüntüleme



Tedavi sonrası 20.aydaki fundus fotoğrafı ve anjiografisi

Detaylar

Durum	:	Kabul:Poster
Sunum Şekli	:	Sözlü Sunum
Bildiri Grubu	:	Tıbbi Retina
Dili	:	Türkçe
Saved:	:	03.07.2017 18:24:32
Submit:	:	04.07.2017 23:26:26

Yazar ve Editöre Özel Bilgiler

Sunan Yazar	:	Muhammet Kaim (muhammet_kaim@hotmail.com)