TP-16 [Erkek Cinsel Sağlığı]

Buschke-Löwenstein tümorü ve başarılı tedavisi: olgu sunumu

Görkem Akça, Hakkı Uzun, Yakup Kaçan, Erdem Orman
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Rize

GİRİŞ: Buschke-Löwenstein tümörü (BLT) veya dev kondiloma aküminata, insan papilloma virüsünün (HPV) çeşitli türlerinin neden olduğu, anogenital bölgede ortaya çıkan, dev boyutlara ulaşan, karnabahar benzeri, tomurcuklanan büyük bir tümördür. Yavaş büyüyen bu tümörün, lokal invazyon, yüksek nüks ve malign transformasyon riski bulunmaktadır. Sıklıkla HPV tip 6 ve 11 ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca immunsupresyon, cinsel partner sayısının fazla oluşu, kronik genital enfeksiyonlar, yetersiz hijyen koşulları hastalık için diğer risk faktörleridir. Biz bu çalışmada nadir görülen, geç başvuru nedeniyle dev boyutlara ulaşan Buschke-Löwenstein tümörü tanısı koyduğumuz ve cerrahi eksizyon uyguladığımız öz bakımı kötü olan hastayı sunuyoruz.

OLGU: 71 yaşında erkek hasta Üroloji polikliniğine penis çevresinde ve skrotum cildinde yerleşimli siğil benzeri lezyonların olması ve bunlara bağlı olarak ilişkiye girmekte zorlanma şikayetiyle başvurdu. Lezyonların yaklaşık 30 yıldır olduğu ve giderek büyüdüğünü ifade etti. Öncesinde şüpheli ilişki öyküsü bildirdi. Özgeçmişinde benign prostat hiperplazisi dışında ek hastalığı ve düzenli ilaç kullanımı yoktu. Eşinde ek hastalık yoktu ancak genital ve jinekolojik muayenesi yapılmamıştı. Öz bakım eksikliği izlenen hastanın fizik muayenesinde penis dorsal taraf komşuluğunda büyüğü yaklaşık 7 cm ve sağ skrotum cildini tama yakın kaplayan büyüğü yaklaşık 6 cm olan multiple kondilom benzeri lezyonlar izlendi (Resim 1 ve Resim 2). Cerrahi eksizyon önerilen hastanın yapılan rutin hemogram, biyokimya, eliza, idrar ve koagülasyon tetkikleri normaldi. Dış merkezde başka bir amaçla yapılan tüm batın görüntülemesinde özellik yoktu. Hastaya spinal anestezi altında cerrahi eksizyon uygulandı. Tüm lezyonlar eksize edilerek mukoza defektleri sütüre edildi (Resim 3). Patoloji sonucu kondiloma akuminata olarak raporlandı. Hastanın işlem sonrası 10. gününde sütürleri alındı. 3. ve 6. ay poliklinik kontrollerinde nüks izlenmedi.

SONUÇ: BLT özellikle ileri yaşlarda anogenital bölgede tutulum gösteren nadir bir tümör olmakla beraber yüksek nüks ve malign transformasyon riskinden dolayı önem arz etmektedir. Tedavisinde birçok seçenek olsa da altın standart yaklaşım gerekirse rekonstrüksiyonla beraber geniş cerrahi rezeksiyondur. Bu tümörlerin cerrahi tedavisi özel uzmanlığa sahip multidisipliner bir ekip gerektirir. Rekonstrüksiyon teknikleri zordur ve yara enfeksiyonu, açılma, hematom, apse gibi tekrar cerrahi müdahale gerektirebilecek komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Bu hastalarda postoperatif nüksleri önlemek için ek tedavi önerilmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Buschke-Löwenstein, HPV, Kondilom

Resim

